

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS



Dirección.: Guayaquil, Km. 12.5 Vía a Daule
Parque California 2, Local G-29
Teléfono: 042 103133 • **Celular:** 0986462317
E-mail: info@jwasociados.com.ec





DORACHERRY

Endectocida para bovinos, ovinos y suinos.
Solución oleosa inyectable

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Principio Activo: Doramectina..... 1 g
Excipientes c.sp.:100 ml

INDICACIONES:

Antiparasitario de amplio espectro contra endo y ectoparásitos para bovinos, ovinos, suinos.

BOVINOS: Para el control de:

- **Nemátodos gastrointestinales** (adultos y L4) de: *Haemonchus* spp., *H. contortus*, *H. placei*, y *H. similis*; *Ostertagia ostertagi* (larvas inhibidas), *O. lyrata*; *Trichostrongylus* spp., *T. axei*, *T. colubriformis*; *Cooperia* spp., *C. oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *C. punctata*, *C. pectinata*, *C. spatulata* y *C. surnabada*; *Oesophagostomum radiatum*; *Bunostomum phlebotomum*; *Strongyloides papillosus*; *Nematodirus helvetianus* y *N. spathiger*; *Trichuris* spp., *T. vulpis* y *T. ovis* (adulto).
- **Nemátodos y pulmonares** (adultos y L4) de: *Dictyocaulus viviparus* y *D. filaria*.
- **Parásitos del ojo:** *Thelazia* spp.

Ectoparásitos:

Garrapata: *Boophilus microplus*, (en predios que quieran erradicar garrapatas administrar cada 21 días).

Ácaros: *Psoroptes ovis*; *Sarcoptes scabiei*.

Piojos: *Linognathus vituli*; *Haematopinus eurytetrus*; *Solenopotes capillatus*.

Ura Berne o Tórsalo: *Dermatobia hominis*; *Hypoderma bovis*; *Hypoderma lineatum*.

Bicheras: *Cochliomya hominivorax*.

También está indicado como auxiliar en el control de piojos masticadores (*Damalinea bovis*).

OVINOS: Para el control de:

- **Gastrointestinales** (adultos y L4): *Haemonchus contortus*; *Ostertagia circumcincta* (incluso larvas inhibidas); *Trichostrongylus* spp., *T. axei*, *T. colubriformis*, *T. vitrinus*; *Chabertia* spp.; *Cooperia* spp., *C. oncophora*, *C. curticei* (solo L4); *Oesophagostomum venulosum* (solo adultos); *Nematodirus* spp.; *Trichuris* spp.
- **Pulmonares:** *Dictyocaulus filaria*.

Ectoparásitos:

Ácaros: *Miasis* (*Cochliomya hominivorax*); gusano de la cabeza (*Oestrus ovis*).

Sarna: *Psoroptes ovis*, (campaña de erradicación), debe administrarse una dosis de 333 ug/Kg de peso (1 ml cada 30 Kg de peso vivo), en 2 dosis, con intervalo de una semana entre ambas.

SUINOS: para el control de:

- **Gastrointestinales** (adultos y L4): *Ascaris suum*; *Hyostrongylus rubidus*; *Oesophagostomum* spp., *O. dentatum*, *O. quadrispinulatum*; *Trichuris suis*; *Strongyloides ramsoni* (adultos).
- **Pulmonares:** *Metastrongylus* spp. Parásitos
- **Renales:** *Stephanurus dentatus*.

Ectoparásitos:

Ácaros: *Sarcoptes scabiei*.

Piojos: *Haematopinus suis*.

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA: Bovinos, Ovinos y Suinos.

DOSIFICACIÓN: Bovinos y Ovinos: Posología: 1 ml cada 50 kg de peso (equivalentes a: 200 ug/kg de p.v. de doramectina) por vía subcutánea preferentemente, en zonas de piel laxa o intramuscular en la región de la nuca. **Garrapata:** *Boophilus microplus*, (en predios que quieran erradicar garrapatas administrar cada 21 días).

Sarna ovina: causada por *Psoroptes ovis*, (campaña de erradicación), debe administrarse una dosis de 333 ug/Kg de peso (1 ml cada 30 Kg de peso vivo), en 2 dosis con intervalo de una semana entre ambas.

Suinos: 1 ml cada 33 kg de peso (equivalentes a: 300 ug/kg de p.v. de Doramectina) por vía intramuscular exclusivamente.

MODO DE EMPLEO: Parenteral, por inyección subcutánea preferentemente en zonas de piel laxa o intramuscular en la región de la nuca en bovinos y ovinos; e intramuscular exclusivamente en suinos.

PERÍODO DE CARENIA: Carne: Bovinos y ovinos: 49 días / Suinos: 28 días. No administrar en hembras en producción láctea, cuya leche se destine para consumo humano o industrialización.

