

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS



Dirección: Guayaquil, Km. 12.5 Vía a Daule
Parque California 2, Local G-29
Teléfono: 042 103133 • **Celular:** 0986462317
E-mail: info@jwasociados.com.ec



FIBAND

Endectocida Pour-on para Bovinos

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Fipronil0,9 g
 Abamectina 0,5 g
 Excipientes c.s.p..... 100,0 ml.

INDICACIONES:

INDICACIONES:

Endectocida pour-on para bovinos.

ESPECTRO DE ACTIVIDAD:

Ectoparásitos: Garrapaticida, mosquicida, bernicida y piojicida.

Ectoparásitos: Garrapatas (*Boophilus microplus*); Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*); Berne (*Dermatobia hominis*); *Hypoderma* spp.; Piojos chupadores (*Linognathus vituli* y *Haematopinus eurysternus*); Masticadores (*Damalinea bovis* y *Solenopotes capillatus*).

Ácaros de la sarna: *Chorioptes bovis*; *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. Auxilia en el control de la mosca de la bichera (*Cochlyomyia homminivorax*).

Endoparásitos: Solo ayuda en el control de parásitos internos.

Nemátodos gastrointestinales: *Ostertagia* spp.; *Haemonchus placei*; *Trichostrongylus* spp.; *Oesophagostomum* spp.; *Nematodirus* spp.; *Strongyloides papillosus*; *Trichuris* spp.

Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus* spp.

ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA: Bovinos.

MODO DE EMPLEO: FIBAND es una solución de uso tópico para aplicación pour-on. Colocar sobre el dorso (lomo) del animal desde la nuca hasta la base de la cola.



Se recomienda repetir el tratamiento cada 35 días.

DOSIFICACIÓN:

1 ml de FIBAND pour-on cada 10 Kg de peso animal, equivalente a: 500 µg (mcg) de Abamectina/Kg p.v. y a 0,9 mg de Fipronil/Kg p.v.

Kg. de peso vivo	Dosis ml
50-200 kg	20 ml
200-300 kg	30 ml
300-400 kg	40 ml
400-500 kg	50 ml

PERÍODO DE CARENIA:

Tiempo de espera para carne: 122 días.

No aplicar en hembras lecheras en producción o en hembras preñadas 3 meses antes del parto.

