

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS



Dirección: Guayaquil, Km. 12.5 Vía a Daule
Parque California 2, Local G-29
Teléfono: 042 103133 • **Celular:** 0986462317
E-mail: info@jwasociados.com.ec



OXITETRACICLINA + DICLOFENACO

Antibiótico de amplio espectro Antiinflamatorio

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina Clorhidrato..... 20.0 g.
 Diclofenaco Sódico..... 0.5 g.
 Excipientes c.s.p. 100 ml

INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la acción de la Oxitetraciclina y como antiinflamatorio en bovinos, ovinos, caprinos y suinos. Tiene actividad sobre bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasmas, Clamidias, Rickettsias, algunos Protozoos y Hongos patógenos.

ESPECTRO DE ACTIVIDAD:

Como Antibiótico: Infecciones del tracto respiratorio: Bronconeumonías y Neumonías

Infecciones del tracto gastrointestinal: Enteritis bacteriana.

Infecciones del aparato urinario y reproductor: Colangitis, Metritis, Prostatitis e infecciones urinarias en general.

Indicado para Mastitis en todas sus formas.

Enfermedades de la piel: Piodermatitis.

Enfermedades específicas que incluyen:

Queratoconjuntivitis, Clamidiosis, Anaplasmosis, Eperitrozoosis y Hemobartenosis, Actinomicosis, Actinibacilosis y procesos de Hidropericardio de origen infeccioso.

Como Antiinflamatorio: Está indicado para el tratamiento sintomático de las Artritis reumatoideas, Osteoporosis y Espondilitis anquilosantes.

Lesiones muculares esqueléticas agudas como: Tendinitis y Bursitis.



ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA:

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Suinos.

MODO DE EMPLEO:

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Suinos: Intramuscular profunda

Lechones: Subcutánea

DOSIFICACIÓN: * 1 ml cada 10 kg de p.v. (equivalente a 200 mg. de Oxitetraciclina Clorhidrato y 5 mg. de Diclofenaco Sódico)

Especies	Dosis	Dosis máxima por sitio de inyección
Bovinos	20 - 50 ml	20 ml
Suinos	10 - 20 ml	10 ml
Ovinos	5 - 8 ml	5 ml
Caprinos	5 - 8 ml	5 ml
Ternero	1 ml / 10 Kg de p.v.	5 ml
Lechones	1 ml / 10 Kg de p.v.s.c	1 ml

PERÍODO DE CARENIA: Carne: 28 días

No administrar a hembras lecheras durante el período de lactación.