

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS



Dirección: Guayaquil, Km. 12.5 Vía a Daule
Parque California 2, Local G-29
Teléfono: 042 103133 • **Celular:** 0986462317
E-mail: info@jwasociados.com.ec



SIPCAR i 3,15%



Endectocida inyectable para bovinos.

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
 Ivermectina..... 3.15 g
 Solventes c.s.p. 100 ml



INDICACIONES:

Ivermectina de acción prolongada para el tratamiento, control y profilaxis de infestaciones por Nemátodos gastrointestinales y pulmonares, así como también para las ectoparasitosis por piojos, sarnas, bernés y garrapatas de los bovinos. El producto posee un mecanismo de absorción lenta y de eficacia prolongada, que elimina los parásitos indicados y previene nuevas infestaciones por largos períodos (efecto profiláctico).

ESPECTRO DE ACTIVIDAD:

- Nemátodos gastrointestinales y pulmonares:** Haemonchus placei (adultos y L4); Ostertagia ostertagi (adultos y L4); Trichostrongylus axei (adultos y L4); Cooperia oncophora (adultos y L4); Cooperia punctata (adultos y L4); Cooperia surnabada (adultos y L4); Cooperia spp. (adultos y L4); Oesophagostomum radiatum (adultos y L4); Bunostomum phlebotomum (adultos y L4); Dictyocaulus viviparus (adultos y L4). Actúa en la profilaxis de las larvas de 3er estadio por un período de entre 5 a 7 semanas.
- Bernés:** Dermatobia hominis (estadios parasitarios). Más de 125 días de eficacia con una reducción próxima al 90%.
- Piojos succionadores:** Haematopinus eurysterunus; Linognathus vituli; Solenopotes capillatus.
- Sarnas causadas por:** Psoroptes ovis; Sarcoptes scabiei var. Bovis. Hasta 28 días de actividad.
- Garrapatas:** Boophilus microplus; 60 a 70 días libres en los cuales las infestaciones por larvas viables serán reducidas a más del 90%. En casos de predios para erradicación contra Boophilus Microplus de debe tratar cada 30 días.

También ayuda en el control de la miasis por Cochliomyia hominivorax; como preventivo de la miasis del ombligo en terneros recién nacidos y en las heridas de castración. También ayuda en el control de la Sarna por Chorioptes bovis.

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA: Bovinos

MODO DE EMPLEO: *1 ml. cada 50 kg de peso vivo de Ivermectina 3,15%, equivalente a una dosis de 630 mcg por kg. de peso vivo. Agitar bien durante un minuto antes de usar. Administrar por inyección subcutánea. Intervalo entre dosis: Entre 5 y 7 semanas contra Nemátodos gastrointestinales y pulmonares, y entre 60 y 70 días contra garrapatas y bernés.

DOSIFICACIÓN: Una sola aplicación es suficiente para combatir infestaciones de sarna psoróptica. Si fuera necesario repetir a los 28 días.

PERÍODO DE CARENCIA: El período de carencia en la carne para consumo es de 122 días. No se aconseja la administración en bovinos de leche en producción. Se recomienda hacer la última aplicación 122 días antes del parto.