


CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS



Dirección: Guayaquil, Km. 12.5 Vía a Daule
Parque California 2, Local G-29
Teléfono: 042 103133 • **Celular:** 0986462317
E-mail: info@jwasociados.com.ec



SIPCAR i

Endectocida inyectable para bovinos, ovinos, suinos y camelidos.

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Ivermectina:1,0 g.

Excipientes c.s.p.:.....100,0 ml.



INDICACIONES:

Endoparasitocida y ectoparasitocida de amplio espectro. (Endectocida).

BOVINOS Y OVINOS:

• **Parásitos gastrointestinales:** Haemonchus sp. Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Trichostrongylus sp., Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Toxocara vitulorum y Trichuris spp.

• **Parásitos pulmonares:** Dictioacaulus viviparus, Dictioacaulus filaria.

• **Ectoparásitos:** Sarcoptes sp., Haematopinus sp., Dermatobia hominis, Linognathus vituli, Psoroptes spp.

También está indicado como preventivo de miasis en el ombligo de recién nacidos y en las heridas de castración.

PORCINOS.

• **Parásitos gastrointestinales:** Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ramsoni.

• **Parásitos pulmonares:** Metastrongylus spp.

• **Parásitos renales:** Stephanurus dentatus.

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS.

Sarcoptes scabiei var. Aucheniae. Lamanema chavezii.

Algunos parásitos internos.

ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA:

Bovinos, Ovinos, Suinos y Camélidos.

MODO DE EMPLEO:

Parenteral, por inyección subcutánea.

Bovinos y Camélidos: En zonas de piel laxa, detrás o delante de la paleta. **Ovinos:** En zonas de piel laxa, detrás o delante de la paleta o también en cara interna del muslo.

Porcinos: Por detrás de la oreja

DOSIFICACIÓN:

Bovinos, Ovinos y Camélidos: *1 ml cada 50 kg de p.v. (equivalentes a 200 µg/kg p.v.).

Como sarnicida ovino deberá administrarse 1 ml cada 45 kg de p.v. (equivalentes a 220 µg/kg p.v.) en dos dosificaciones separadas por 7 días.

Porcinos: *1 ml cada 33 kg de p.v. (equivalentes a 300 µg/kg p.v.).

PERÍODO DE CARENIA:

Bovinos: no enviar a faena animales cuya carne se destine para consumo humano hasta pasados 35 días del último tratamiento.

Ovinos: No enviar animales a faena cuya carne se destine a consumo humano hasta pasados 28 días del último tratamiento.

Porcinos: No enviar animales a faena cuya carne se destine a consumo humano hasta pasados 18 días del último tratamiento. No usar en ganado lechero en lactación, ni 28 días antes del parto.

